

НОВОСТИ

Верно поставить диагноз

Центр ранней диагностики опухолей печени открыт в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН. В реализации этого проекта приняла участие компания Bayer Schering Pharma. В течение этого года планируется открытие подобных центров ранней диагностики в других федеральных округах России.

В России ежегодно регистрируется около 6 тыс. пациентов с диагнозом рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Самая распространенная форма рака печени может быть обнаружена в 90% случаях первичных злокачественных опухолей печени у взрослых пациентов. В настоящее время ГЦК признана третьей основной причиной смертности от онкологических заболеваний в мире.

— Основным методом лечения ГЦК является хирургическое вмешательство, — поясняет Юрий Патютко, профессор ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. — Но некоторые специалисты в России даже не знают о том,

что в случае диагноза «рак печени» возможно проведение операции. С 1990 по 2008 год мы провели более 200 резекций печени, в том числе 173 в связи с ГЦР. Среди всех пациентов послеоперационные осложнения встречались в 48%, а летальность — в 7,8%. Радикальная резекция печени позволяет достигнуть длительной ремиссии опухолевого процесса. Я уверен, что во всех случаях предпочтение следует отдавать хирургическому методу лечения. Но важно, чтобы диагноз был определен вовремя.

— Очень часто специалисты и пациенты сталкиваются с тем, что нет необходимой информации о системе и вариантах лечения рака печени, — подтверждают в компании Bayer Schering Pharma. — Именно по этой причине компания приняла решение о соз-

дании Центра ранней диагностики опухолей печени. Общая концепция работы была разработана Bayer Schering Pharma, а затем адаптирована в соответствии с потребностями Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Один из важнейших факторов, определяющих успех лечения рака печени, — ранняя диагностика заболевания, когда возможно хирургическое вмешательство. И для того чтобы не упустить момент, больным с высоким риском развития этого заболевания рекомендовано проведение ультразвукового исследования печени, а также определение в крови альфа-фетопротеина — неспецифического опухолевого маркера.

Благодаря сотрудничеству компании и института пациенты, заинтересованные в своем здоровье, смогут обратиться в Центр,

получить здесь квалифицированную консультацию, пройти необходимое обследование, а в дальнейшем, если потребуется, и лечение в стационаре.

Компания Bayer Schering Pharma профинансировала обучение специалистов в европейской клинике. В конце сентября этого года группа врачей из России пройдет курс подготовки в Австрии. Эти специалисты будут работать в новых открываемых Центрах ранней диагностики опухолей печени. Их опыт будет востребован в клиниках Урала и Сибири. Дело в том, что в азиатско-тихоокеанском регионе заболеваемость первичного рака печени в несколько раз выше, чем в среднем по России. Если в европейской части страны специалисты насчитывают 4—5 заболевших на 100 тыс. человек, то, например, в Якутии этот показатель равен 17. Поэтому в планах компании Bayer Schering Pharma — поддержка открытия центров и в отдаленных регионах страны.